

Entwicklung des Schweizer Nutztierbestandes

Autorin: Bettina Abplanalp

Quellen: Agristat, Schätzungen 2026; Bundesamt für Statistik (BFS); Bundesamt für Landwirtschaft (BLW); Identitas AG, Tierverkehrsdatenbank

Vor allem aufgrund der Trockenheit und dem daraus folgenden Futtermangel nimmt der Nutztierbestand gemessen in Grossvieheinheiten (GVE) im Jahr 2026 ab. Obwohl die Geflügel- und Schweinebestände gegenüber dem Vorjahr um 1388 GVE bzw. 954 GVE steigen, vermögen sie den drastischen Rückgang beim Rindvieh (-20 094 GVE) nicht aufzufangen. Auch die Equiden- und Schafbestände gehen weiter zurück. Die übrigen Tierkategorien fallen weniger ins Gewicht.

Bemerkungen zu den Statistiken und der Methode

Bis 2025 lagen für den vorliegenden Artikel die definitiven Daten der landwirtschaftlichen Strukturdaten des Bundesamtes für Statistik vor. Der Stichtag für diese Bestände liegt seit 2015 im Januar. Für 2026 wurden diese Daten extrapoliert. Für das Rindvieh und die Equiden wurden dazu die Augustdaten der Tierverkehrsdatenbank (TVD) benutzt. Für die übrigen Tiergattungen wurden provisorische AGIS-Daten verwendet, welche das Bundesamt für Landwirtschaft freundlicherweise zur Verfügung stellte.

In Grafik 1 werden die Tierbestände mit der Basis 2016 = 100 indiziert, um die Entwicklung der einzelnen Tiergattungen vergleichbar darzustellen. Bei den Equiden ist ein Bruch zwischen den Jahren 2017 und 2018 ersichtlich. Damals wurde auf die Daten der TVD als Quelle umgestellt. Ein ähnlicher Bruch aufgrund der Umstellung auf TVD-Daten ergibt sich bei den Schafen und Ziegen zwischen 2023 und 2024.

Die Daten der Bio-Bestände lassen sich zum aktuellen Zeitpunkt mit den vorhandenen AGIS-Daten nur unzureichend schätzen. Eine Beurteilung der Entwicklung der Bio-Bestände wird erst mit den definitiven Strukturdaten des BFS (Publikation ca. Mai 2027) möglich sein.

Wir bedanken uns beim Bundesamt für Landwirtschaft für die Übermittlung der verfügbaren provisorischen Kantonsdaten und bei der Identitas AG für die Auszüge aus der TVD. Bei allen an dieser Stelle publizierten Daten des Jahres 2026 handelt es sich um Schätzungen. Agristat verwendet die geschätzten Bestände u. a. für die landwirtschaftliche Gesamtrechnung des laufenden Jahres. Genauere Zahlen zu den landwirtschaftlichen Tierbeständen des Jahres 2026 werden mit der Publikation der provisorischen Daten der landwirtschaftlichen Strukturerhebung durch das Bundesamt für Statistik zu Beginn des Jahres 2027 und jener der definitiven Daten im Mai 2027 verfügbar werden.

Évolution du cheptel suisse

Auteure : Bettina Abplanalp

Sources : Agristat, estimations 2026 ; Office fédéral de la statistique (OFS) ; Office fédéral de l'agriculture (OFAG) ; Identitas AG, base de données sur le trafic animal

Principalement en raison de la sécheresse et de la pénurie de fourrage qui en découle, l'effectif des animaux de rente, exprimé en unités de gros bétail (UGB), diminue en 2026. Bien que les effectifs de volailles et de porcs augmentent respectivement de 1388 UGB et de 954 UGB par rapport à l'année précédente, ces hausses ne suffisent pas à compenser la forte baisse enregistrée chez les bovins (-20 094 UGB). Les effectifs d'équidés et de moutons continuent également de reculer. Les autres catégories d'animaux sont moins importantes.

Remarques concernant les statistiques et la méthode

Jusqu'en 2025, les données définitives relatives aux structures agricoles fournies par l'Office fédéral de la statistique étaient disponibles pour le présent article. Depuis 2015, la date de référence pour ces effectifs se situe en janvier. Pour 2026, ces données ont été extrapolées. Pour les bovins et les équidés, les données du mois d'août issues de la banque de données sur le trafic des animaux (BDTA) ont été utilisées à cette fin. Pour les autres espèces animales, des données AGIS provisoires ont été utilisées, aimablement mises à disposition par l'Office fédéral de l'agriculture.

Dans le graphique 1, les effectifs animaux sont indexés sur la base 2016 = 100 afin de présenter de manière comparable l'évolution des différentes espèces animales. Une rupture est visible entre 2017 et 2018 pour les équidés. À cette époque, les données de la BDTA ont été adoptées comme source. Une rupture similaire due au passage aux données de la BDTA est observée pour les moutons et les chèvres entre 2023 et 2024.

À l'heure actuelle, les données disponibles dans AGIS ne permettent pas d'estimer de manière satisfaisante les effectifs biologiques. Une évaluation de l'évolution des effectifs biologiques ne sera possible qu'avec les données définitives du relevé des structures agricoles de l'OFS (publication prévue vers mai 2027).


Nous remercions l'Office fédéral de l'agriculture pour nous avoir transmis les données cantonales provisoires disponibles et Identitas SA pour les extraits tirés de la BDTA. Toutes les données de l'année 2026 publiées ici sont des estimations. Agristat utilise les effectifs estimés notamment pour les comptes économiques de l'agriculture de l'année en cours. Des chiffres plus précis sur les effectifs agricoles de l'année 2026 seront disponibles avec la publication des données provisoires du relevé des structures agricoles par l'Office fédéral de la statistique au début de l'année 2027 et celles des données définitives en mai 2027.

Grafik 1: Indexierte Entwicklung der Nutztierbestände

Graphique 1 : Évolution indexée des effectifs d'animaux de rente

Bestand 2016 = 100; am rechten Rand wird die Änderung 2026 in Prozent angezeigt.

Effectif 2016 = 100 ; au bord droit, la variation 2026 est indiquée en pour cent.



Rindvieh

Die Bestandesdaten befinden sich in Tabelle 1. Der Gesamtbestand des Rindviehs blieb in den letzten Jahren annähernd stabil (siehe Grafik 1). Ein etwas grösserer Einbruch erfolgt im Jahr 2026. Die Trockenheit und der damit verbundene Futtermangel wirkt sich auf den Rindviehbestand aus. Erschwerend kommen Virus-Erkrankungen hinzu. Am meisten leidet der Bestand der Kühe und Jungrinder unter diesen Umständen. So nimmt der Bestand der Milchkühe um 3,3% und der von Jungrindern um 2,5% ab. Erstmals nimmt auch der Bestand der anderen Kühe ab (-0,8%), wenn auch nicht im gleichen Ausmass wie jener der Milchkühe.

Im Jahr 2023 schien sich das Geschlechterverhältnis bei den Geburten zu stabilisieren (siehe Grafik 2). Seit der zweiten Hälfte 2024 steigt der Anteil der weiblichen Geburten jedoch wieder an. Inzwischen übertrifft die Anzahl der Geburten weiblicher Kälber jene der männlichen Kälber um knapp 24%. Da im Bio-Landbau ab 2026 Spermasexing erlaubt ist, wird dieser Anteil weiter zunehmen.

Bovins


Les données relatives au cheptel figurent dans le tableau 1. Le cheptel bovin total est resté relativement stable ces dernières années (voir graphique 1). Une baisse un peu plus marquée est prévue en 2026. La sécheresse et la pénurie de fourrage qui en découle ont des répercussions sur le cheptel bovin. Des maladies virales viennent aggraver la situation. Ce sont les vaches et les jeunes bovins qui souffrent le plus de ces circonstances. Ainsi, le cheptel de vaches laitières diminue de 3,3% et celui des jeunes bovins de 2,5%. Pour la première fois, le cheptel des autres vaches recule également (-0,8%), bien que dans une moindre mesure que celui des vaches laitières.

En 2023, le rapport entre les sexes à la naissance semblait se stabiliser (voir graphique 2). Depuis le second semestre 2024, la proportion de naissances de femelles est toutefois à nouveau en hausse. Désormais, le nombre de naissances de veaux femelles dépasse celui des veaux mâles de près de 24%. Le sexage du sperme étant autorisé en agriculture biologique à partir de 2026, cette proportion continuera d'augmenter.

Grafik 2: Anteil der Kuhkälber-Geburten

Graphique 2 : Part des vêlages de veaux femelles

In Prozent nach Meldemonat ~ En pour cent selon le mois de la déclaration



Equiden (Pferdegattung)

Die Equiden umfassen Pferde, Pony, Esel, Maultiere und Maulesel, wobei die Pferde mit Abstand die grösste Fraktion darstellen. Sie werden überwiegend für Sport und Freizeit genutzt. Etwa 70 % der von der TVD erfassten Equiden stehen in Landwirtschaftsbetrieben. Der Bestand der Equiden auf Landwirtschaftsbetrieben ist seit dem Jahr 2024 rückläufig. Insbesondere die Pferdezucht ist unter Druck und die Anzahl Fohlen geht weiter zurück, was sich auch auf den Jungpferdebestand auswirkt.

Schafe und Ziegen

Die Zunahme der Schaf- und Ziegenbestände um 3,3% bzw. 6,9% im Jahr 2024 muss aufgrund der Umstellung auf die TVD als Quelle der Zahlen kritisch hinterfragt werden. Im Jahr 2026 bleibt der Ziegenbestand gegenüber dem Vorjahr praktisch unverändert, während der Bestand der Schafe weiter zurückgeht (-1,3%). Die Produktion von Schaffleisch nimmt im Jahr 2026 zu und zugleich geraten die Preise für Schlachtlämmer unter Druck, liegen aber noch auf deutlich höherem Niveau als in den Vorjahren (Grafik 3). Die vermehrten Schlachtungen, zusammen mit der Wolfsproblematik und der Moderhinkesanierung, werden wahrscheinlich zu einem weiteren Rückgang des Schafbestandes führen.


Équidés (espèce chevaline)

Les équidés comprennent les chevaux, les poneys, les ânes, les mulets et les bardots, les chevaux représentant de loin la plus grande partie de ce groupe. Ils sont principalement utilisés pour le sport et les loisirs. Environ 70 % des équidés enregistrés par la TVD se trouvent dans des exploitations agricoles. Le cheptel d'équidés dans les exploitations agricoles est en baisse depuis 2024. L'élevage de chevaux, en particulier, est sous pression et le nombre de poulains continue de diminuer, ce qui a également des répercussions sur le cheptel de jeunes chevaux.

Moutons et chèvres

L'augmentation des cheptels ovins et caprins de respectivement 3,3% et 6,9% en 2024 doit être considérée avec prudence en raison du passage à la BDTA comme source des données. En 2026, le cheptel caprin reste pratiquement inchangé par rapport à l'année précédente, tandis que le cheptel ovien continue de reculer (-1,3%). La production de viande ovine augmente en 2026 et, parallèlement, les prix des agneaux de boucherie subissent une pression à la baisse, tout en restant à un niveau nettement supérieur à celui des années précédentes (graphique 3). L'augmentation des abattages, conjuguée à la problématique du loup et à la lutte contre le piétiin, entraînera probablement une nouvelle baisse du cheptel ovien.

Grafik 3: Schaffleischproduktion und Produzentenpreis für Schlachtlämmer
Graphique 3 : Production de viande de mouton et prix à la production des agneaux
Fleischproduktion über 12 Monate summiert und Preis als gleitendes 12-Monats-Mittel
Production de viande cumulée sur 12 mois et prix comme moyenne glissante sur 12 mois



Hirsche und Neuweltkameliden

Der Bestand der Dam- und Rothirsche nimmt 2026 zu (+4 % bzw. +1 %). Der Bestand der Neuweltkameliden steigt insgesamt ebenfalls. Während der Alpaka-Bestand zunimmt (+4 %), sinkt der Lamabestand um 1,1 %.

Schweine

Der Schweinebestand hat seit 2010 deutlich abgenommen, bleibt im Jahr 2026 (Stand Januar 2026) aber gegenüber dem Vorjahr praktisch unverändert, mit einer leicht positiven Tendenz. Das hatte ab Herbst 2025 zur Folge, dass mehr Schweine produziert wurden, als der Markt aufnehmen konnte. Um den Markt zu entlasten, wurden Ferkel geschlachtet und Schweinefleisch exportiert. Trotzdem gerieten die Schlachtschweinepreise weiter unter Druck und erreichten in den Sommermonaten einen Tiefststand von CHF 2.65 für QM-Schlachtschweine. Wie sich der Schweinezyklus weiter entwickeln wird, ist noch unsicher. Während die Jahre 2024 und 2025 dank tiefer Produktion mit guten Preisen aufwarten konnten, bringt das Jahr 2026 die Kehrtwende (Grafik 4). Eine Erholung des Schlachtschweinemarktes dürfte nur mit einer Reduktion des Schweinebestandes möglich sein.

Cerfs und camélidés du Nouveau Monde

Les effectifs de daims et de cerfs élaphe augmenteront en 2026 (+4 % et +1 % respectivement). Les effectifs des camélidés du Nouveau Monde sont également en hausse globale. Alors que le cheptel d'alpagas progresse (+4 %), celui des lamas recule de 1,1 %.


Porcs

Le cheptel porcin a considérablement diminué depuis 2010, mais reste pratiquement inchangé en 2026 (situation en janvier 2026) par rapport à l'année précédente, avec une légère tendance à la hausse. Cela a eu pour conséquence, à partir de l'automne 2025, que la production de porcs a dépassé la capacité d'absorption du marché. Afin de soulager le marché, des porcelets ont été abattus et de la viande de porc a été exportée. Malgré cela, les prix des porcs de boucherie sont restés sous pression et ont atteint, pendant les mois d'été, un niveau plancher de 2.65 CHF pour les porcs de boucherie AQ. L'évolution future du cycle porcin reste incertaine. Alors que les années 2024 et 2025 ont été marquées par de bons prix grâce à une production faible, l'année 2026 marque un revirement de tendance (graphique 4). Une reprise du marché des porcs de boucherie ne devrait être possible qu'avec une réduction du cheptel porcin.

Grafik 4: Der Schweinezyklus

Graphique 4 : Le cycle du porc

Fleischproduktion über 12 Monate summiert und Preis als gleitendes 12-Monats-Mittel
Production de viande cumulée sur 12 mois et prix comme moyenne glissante sur 12 mois



Nutzhühner

Nach den guten Produktionsbedingungen in den Corona-Jahren 2020 und 2021 geriet die Eierproduktion ab Mitte 2022 und die Geflügel-fleischproduktion ab 2023 unter Druck. 2023 und 2024 stagnierte der Hühnerbestand entsprechend. Die Baisse scheint seit 2025 überwunden zu sein und der Hühnerbestand nimmt im Jahr 2026 um weitere 1,8% zu. Die Zahlen müssen allerdings mit Vorsicht interpretiert werden. Einerseits sind aufgrund der Rein-Raus-Methode bei den Geflügelbeständen grössere Schwankungen möglich. Andererseits ist der Stichtag im Januar nicht optimal, da grössere Schwankungen in den Beständen um Weihnachten/Neujahr und vor Ostern (mit von Jahr zu Jahr wechselndem Termin) möglich sind.

Kaninchen

Der Höchstbestand im Jahr 2010 betrug 100 107 Tiere. Seither ging es nur bergab. Im Jahr 2026 erholen sich die Kaninchenbestände erstmals und nehmen gegenüber dem Vorjahr um 5% zu.

Gesamtbestand

Mit dem weiterhin wachsenden Geflügelbestand steigt auch die Gesamtzahl der Nutztiere an – obwohl sich die Bestände anderer Tierarten kaum verändern (z. B. Schweine) oder sogar deutlich rückläufig sind (Rindvieh, Schafe, Equiden) (Grafik 5). Da Geflügel meist in großen Beständen in Ställen gehalten wird und der Auslauf sich oft nur auf eine begrenzte Fläche rund um den Stall beschränkt, ist die starke Zunahme der Geflügelhaltung in den letzten Jahren im Landschaftsbild wenig sichtbar.

Poules de rente

Après les bonnes conditions de production enregistrées pendant les années de pandémie de 2020 et 2021, la production d'œufs a été mise sous pression à partir de la mi-2022 et celle de viande de volaille à partir de 2023. En 2023 et 2024, le cheptel de poulets a donc stagné. La baisse semble avoir été surmontée depuis 2025 et le cheptel de poulets augmente encore de 1,8% en 2026. Ces chiffres doivent toutefois être inter-prétés avec prudence. D'une part, la méthode d'entrée-sortie utilisée pour les cheptels de volaille peut entraîner des fluctuations importantes. D'autre part, la date de référence en janvier n'est pas optimale, car des fluctuations importantes des cheptels sont possibles autour de Noël/Nouvel An et avant Pâques (dont la date varie d'une année à l'autre).

Lapins

En 2010, le cheptel a atteint un pic de 100 107 animaux. Depuis, la tendance n'a cessé de baisser. En 2026, les effectifs de lapins se redressent pour la première fois et augmentent de 5% par rapport à l'année précédente.

Effectif total


Avec l'augmentation continue du cheptel de volailles, le nombre total d'animaux d'élevage augmente également – alors que les effectifs d'autres espèces animales ne varient guère (par exemple, les porcs) ou sont même en net recul (bovins, ovins, équidés) (graphique 5). Comme la volaille est généralement élevée en grands troupeaux dans des poulaillers et que l'accès à l'extérieur se limite souvent à une zone restreinte autour du poulailler, la forte augmentation de l'élevage de volaille ces dernières années est peu visible dans le paysage.

Grafik 5: Entwicklung der Tierzahlen nach Gattung, 2007-2026

Graphique 5 : Évolution du nombre d'animaux par espèce, 2007-2026

In Klammer: geschätzte prozentuale Veränderung 2026 im Vergleich zum Vorjahr

Entre parenthèses : variation estimée en 2026 par rapport à l'année précédente en pour cent




Nach GVE ergibt sich ein völlig anderes Bild, da das Geflügel wenig zu den GVE beiträgt. Die GVE-Rangliste verweist darauf, dass das Rindvieh entsprechend auch bezüglich Futterverbrauch und Hofdüngerproduktion mit Abstand an der Spitze liegt. Die gut 2000 zusätzlichen GVE beim Geflügel und Schweine vermögen den starken Rückgang beim Rindvieh (-20 000 GVE) nicht aufzufangen. Somit sinkt der Tierbestand nach GVE deutlich stärker als im Vorjahr und erreicht insgesamt einen neuen Tiefststand (Grafik 6).

En termes d'UGB, le tableau est tout à fait différent, car la volaille contribue peu au total des UGB. Le classement par UGB montre que les bovins occupent de loin la première place, notamment en ce qui concerne la consommation fourragère et la production d'engrais de ferme. Les quelque 2000 UGB supplémentaires provenant de la volaille et des porcs ne suffisent pas à compenser la forte baisse enregistrée chez les bovins (-20 000 UGB). Ainsi, le cheptel en UGB diminue nettement plus fortement que l'année précédente et atteint globalement un nouveau plus bas historique (graphique 6).

Grafik 6: Entwicklung der Grossvieheinheiten nach Tierkategorie, 2007-2026
 Graphique 6 : Évolution des unités de gros bétail par catégorie d'animaux, 2007-2026

In Klammer: geschätzte prozentuale Veränderung 2026 im Vergleich zum Vorjahr
 Entre parenthèses : variation estimée en 2026 par rapport à l'année précédente en pour cent



Trockenheit, Futtermangel und Krankheiten

Nachdem im Jahr 2025 die Anzahl Geburten bei den Wiederkäuern deutlich zurück gingen, erholten sich diese im Jahr 2026 wieder. Das gute Futter 2025 sowie die Eindämmung der Blauzungenkrankheit führten zu einer positiven Entwicklung bei den Wiederkäuergeburten. Die Kälbergeburten nahmen ab Herbst 2025 zu (Grafik 7). Zusätzlich zu den tiefen Geburtenzahlen bis im Sommer 2025 gerät der Rindviehbestand aktuell wegen Futtermangel weiter unter Druck. Das sehr trockene Jahr 2026 hat deutliche Auswirkungen auf den gesamten Bestand. Da das Futter bereits im Sommer fehlte und die Wintervorräte kleiner ausfallen, werden vermehrt Kühe und weibliche Jungrinder geschlachtet. Die Folgen werden auch nächstes Jahr spürbar sein, weil Kühe und Kälber für die Nachzucht und Mast fehlen werden.


Sécheresse, pénurie de fourrage et maladies

Après une baisse sensible du nombre de naissances chez les ruminants en 2025, celui-ci s'est redressé en 2026. La bonne qualité du fourrage en 2025 ainsi que l'endiguement de la maladie fièvre catarrhale ovine ont conduit à une évolution positive des naissances chez les ruminants. Les naissances de veaux ont augmenté à partir de l'automne 2025 (graphique 7). Outre les faibles chiffres de naissances enregistrés jusqu'à l'été 2025, le cheptel bovin subit actuellement une pression accrue en raison de la pénurie de fourrage. L'année 2026, très sèche, a des répercussions significatives sur l'ensemble du cheptel. Le fourrage faisant déjà défaut en été et les réserves hivernales s'avérant plus faibles, de plus en plus de vaches et de jeunes bovins femelles sont abattus. Les conséquences se feront encore sentir l'année prochaine, car il manquera des vaches et des veaux pour la reproduction et l'engraissement.

Grafik 7: Kuhbestand und Geburten nach dem Monat der Meldung

Graphique 7 : Effectif de vaches et naissances selon le mois de l'annonce

In tausend Kühen oder Geburten; bis August 2026 ~ En milliers de vaches ou de naissances ; jusqu'en août 2026



Auf die übrigen Raufutterverzehrer wie Schafe und Ziegen wird sich der Futtermangel ebenfalls auswirken. So nehmen im August sowohl bei den Schafen wie auch bei den Ziegen die Schlachtungen gegenüber dem Vorjahresmonat deutlich zu.

Auch die Schweinehalter stehen vor neuen Herausforderungen. Weniger wegen Futtermangel, dafür wegen Ausbrüchen von Tierseuchen wie der Enzootischen Pneumonie (EP). Einzig die Geflügelbranche scheint sich weiter positiv zu entwickeln.

La pénurie fourragère aura également des répercussions sur les autres animaux consommant du fourrage grossier, tels que les moutons et les chèvres. Ainsi, en août, les abattages augmentent nettement tant chez les moutons que chez les chèvres par rapport au même mois de l'année précédente.

Les éleveurs de porcs sont eux aussi confrontés à de nouveaux défis. Moins en raison de la pénurie d'aliments pour animaux qu'en raison de flambées d'épizooties telles que la pneumonie enzootique (EP). Seul le secteur avicole semble continuer à évoluer favorablement.

Tabelle 1: Nutztierbestand nach Alter und Nutzungsart
Tableau 1: Effectifs du bétail de rente selon l'âge et le genre d'utilisation

Kategorie	2023	2024	2025	2026 ¹	Veränderung 2026/2025		Catégorie
					Variation 2026/2025		
					absolut	%	
Rindvieh inklusive Wasserbüffel	1 528 595	1 533 483	1 528 177	1 509 062	-19 115	-1.3	Bétail bovin (y compris les buffles)
Weiblich	1 272 664	1 276 360	1 272 526	1 251 841	-20 685	-1.6	Femelles
Rinder < 160 Tage	169 266	171 754	171 986	175 426	3 440	2.0	Bovins < 160 jours
Rinder 160-365 Tage	126 800	123 750	123 537	122 302	-1 235	-1.0	Bovins 160-365 jours
Rinder 365-730 Tage	218 844	217 243	214 707	209 339	-5 368	-2.5	Bovins 365-730 jours
Rinder > 730 Tage	85 125	89 220	89 843	90 741	898	1.0	Bovins > 730 jours
Kühe	672 629	674 393	672 453	654 033	-18 420	-2.7	Vaches
Milchkühe	532 319	527 397	524 354	507 168	-17 186	-3.3	Vaches laitières
Andere Kühe	140 310	146 996	148 099	146 865	-1 234	-0.8	Autres vaches
Männlich	255 931	257 123	255 651	257 221	1 570	0.6	Mâles
Rinder < 160 Tage	131 702	133 556	129 440	132 029	2 589	2.0	Bovins < 160 jours
Rinder 160-365 Tage	77 095	76 329	78 152	78 934	782	1.0	Bovins 160-365 jours
Rinder 365-730 Tage	37 555	37 310	38 011	36 110	-1 901	-5.0	Bovins 365-730 jours
Rinder > 730 Tage	9 579	9 928	10 048	10 148	100	1.0	Bovins > 730 jours
Equiden	81 561	81 312	80 554	79 517	-1 037	-1.3	Équidés
< 180 Tage	167	168	146	135	-11	-7.5	< 180 jours
180-900 Tage	4 974	4 951	4 594	4 410	-184	-4.0	180-900 jours
> 900 Tage	76 420	76 193	75 814	74 972	-842	-1.1	> 900 jours
Schafe	362 375	374 239	355 639	350 982	-4 657	-1.3	Moutons
Weidelämmer	15 377	...	...	...	...	...	Agneaux de pâturage
Lämmer < 180 Tage	...	75 974	66 290	65 627	-663	-1.0	Agneaux < 180 jours
Jungschafe < 1 Jahr	111 384	...	...	...	...	...	Jeunes moutons < 1 an
Jungschafe 180-365 Tage	...	66 884	65 476	64 194	-1 282	-2.0	Jeunes moutons 180-365 jours
Andere weibliche Schafe > 1 Jahr	210 960	...	...	...	...	...	Autres brebis > 1 an
Andere weibliche Schafe > 365 Tage	...	202 655	195 190	192 848	-2 342	-1.2	Autres brebis > 365 jours
Schafe gemolken	14 616	12 576	12 783	12 604	-179	-1.4	Brebis laitières
Widder > 1 Jahr	10 038	...	...	...	...	...	Béliers > 1 an
Andere Schafe > 365 Tage alt, männlich	...	16 150	15 900	15 709	-191	-1.2	Autres moutons mâles > 365 jours
Ziegen	81 199	86 796	85 591	86 121	530	0.6	Chèvres
Zicklein < 180 Tage	...	4 053	3 533	3 544	11	0.3	Chevreaux < 180 jours
Jungziegen < 1 Jahr	13 294	...	...	...	...	...	Chevreaux < 1 an
Jungziegen 180-365 Tage	...	15 036	14 855	14 394	-461	-3.1	Chevreaux 180-365 jours
Andere weibliche Ziegen > 1 Jahr	27 044	...	...	...	...	...	Autres chèvres femelles > 1 an
Andere Ziegen > 365 Tage, weiblich	...	32 719	31 874	32 225	351	1.1	Autres chèvres femelles > 365 jours
Milchziegen	34 225	28 595	28 666	28 895	229	0.8	Chèvres laitières
Ziegenböcke > 1 Jahr	3 504	...	...	...	...	...	Boucs > 1 an
Andere männliche Ziegen > 365 Tage	...	6 393	6 663	7 063	400	6.0	Autres chèvres mâles > 365 jours
Zwergziegen	3 132	...	...	...	...	...	Chèvres naines

./.

Tabelle 1: Nutztierbestand nach Alter und Nutzungsart
Tableau 1 : Effectifs du bétail de rente selon l'âge et le genre d'utilisation

Kategorie	2023	2024	2025	2026 ¹	Veränderung 2026/2025		Catégorie
					Variation 2026/2025		
					absolut	%	
Hirsche	13 212	13 074	12 449	12 877	428	3.4	Cerfs et daims
Damhirsche	10 628	10 487	10 109	10 513	404	4.0	Daims
Rothirsche	2 584	2 587	2 340	2 363	23	1.0	Cerfs
Neuweltkameliden	6 765	6 960	6 989	7 127	138	2.0	Camélidés du Nouveau-monde
Lamas	2 895	2 838	2 781	2 750	-31	-1.1	Lamas
Alpakas	3 870	4 122	4 208	4 376	168	4.0	Alpagas
Schweine	1 324 415	1 274 949	1 257 722	1 267 080	9 358	0.7	Porcs
Ferkel	515 527	503 115	492 549	497 748	5 199	1.1	Porcelets
Saugferkel	226 849	220 502	218 854	221 043	2 189	1.0	Porcelets allaités
abgesetzte Ferkel	288 678	282 613	273 695	276 706	3 011	1.1	Porceletes sevrés
Remonten und Mastschweine	705 835	672 524	668 164	672 173	4 009	0.6	Porcs de renouvellement et à l'engrais
Zuchteber	2 175	2 000	1 961	2 000	39	2.0	Verrats d'élevage
Zuchtsauen	100 878	97 310	95 048	95 158	110	0.1	Truies
säugende	24 108	23 366	22 828	23 011	183	0.8	allaitantes
nicht säugende	76 770	73 944	72 220	72 148	-72	-0.1	non allaitantes
Nutzhühner	13 152 340	13 168 475	13 393 810	13 640 628	246 818	1.8	Poules de rente
Junghennen, -hähne und Küken	1 231 179	1 237 026	1 214 342	1 227 700	13 358	1.1	Jeunes poules, jeunes coqs et poussins
Zuchttiere Legelinien	94 710	100 288	90 202	84 790	-5 412	-6.0	Lignes pour la production d'œufs à couvrir
Legehennen	3 477 394	3 467 661	3 577 205	3 648 749	71 544	2.0	Poules pondeuses
Zuchttiere Mastlinien	269 111	209 493	182 039	182 767	728	0.4	Poules et coqs d'élevage
Mastpoulets	8 079 946	8 154 007	8 330 022	8 496 622	166 600	2.0	Poulets de chair
Truten	120 805	88 214	79 316	81 695	2 379	3.0	Dindes
Kaninchen	41 398	29 534	28 175	29 584	1 409	5.0	Lapins

¹ Schätzung von Agristat

¹ Estimation par Agristat

Bis zum Jahr 2026: Bundesamt für Statistik (BFS), landwirtschaftliche Betriebszählungen und landwirtschaftliche Betriebsstrukturerhebungen, 2026: Schätzung durch Agristat

Jusqu'à l'an 2026 : Office fédéral de la statistique (OFS), recensements des exploitations agricoles et relevés des structures agricoles, 2026 : Estimation établie par Agristat